

यो जानकारी विरामीहरूको लागि हो ।

केलाइटिक् ४०% मलम

(Kelytic 40% ointment)

बाहिरी प्रयोगको लागि मात्र

Composition (सुत्र)

Salicylic acid BP 40% w/w ointment (मलम)

केलाइटिक् ४०% प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले यो जानकारी राम्रो सँग पढ्नु होला ।

१. औषधिको नाम

केलाइटिक् ४०% मलम

२. औषधिको बारेमा (Description)

केलाइटिक् ४०% मलममा औषधि Salicylic Acid 40% छ । यो औषधिले Keratolytic र Caustic असर दिन्छ । केलाइटिक् ४०% हात र खुट्टाको ठेला (Callus) र मुसाको (Warts) उपचारमा प्रयोग गरिन्छ ।

३. केलाइटिक्मा के छ ?

केलाइटिक्मा Salicylic Acid 40% w/w औषधि छ ।

४. केलाइटिक्को प्रयोगहरू के के हुन् ?

केलाइटिक् ४०% Keratolytic र Caustic असरको लागि मुसामा र हात, खुट्टाको ठेलामा सतही (Topically) रूपमा प्रयोग गरिन्छ ।

५. केलाइटिक् ४०% कति मात्रामा र कसरी प्रयोग गर्ने ?

- दिनको १ पटक अथवा चिकित्सको सल्लाह बमोजिम ।

प्रयोग गर्ने तरिका

- केलाइटिक् ४०% बाहिरी प्रयोगको लागि मात्र हो ।
 - असर परेको भाग (मुसा वा ठेला) लाई राम्रो सँग विस्तारै पानीले धुनुहोला ।
 - मुसालाई (Wart) मनतातो पानीमा ५ मिनेट सम्म भिजाउनुहोला ।
 - त्यस पछि एकछिन सुक्न दिनुहोला ।
 - मुसा वा ठेला नजिकैको छालालाई औषधिबाट बचाउनुका लागि Vaseline or Moisturizing मलम मुसा वा ठेलाको वरिपरि छालामा लगाउनुहोला ।
 - औषधि लगाउँदा मुसा र ठेलामा मात्र पर्नेगरी लगाउनुहोला, वरिपरिको छालामा नपार्नुहोला ।
 - त्यसपछि राम्रोसँग सुक्न छाडिदिनुहोला ।
 - यहि प्रक्रियालाई दिनको १ वा २ पटक दोहोर्याउनु होला वा चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम गर्नुहोला ।
- ### ७. कुन अवस्थामा र कुन ठाँउमा केलाइटिक् ४०% प्रयोग गर्न नहुने ?
- केलाइटिक् ४०% अनुहार, आँखाको नजिक, नाक, मुखमा नलगाउनुहोला ।
 - केलाइटिक् ४०% धेरै ठाँउमा (क्षेत्रफलमा) लामो समय (१२ हप्ता भन्दा बढि) नलगाउनुहोला ।
 - चोट लागेको, काटेको, रातो भएको छालामा केलाइटिक् ४०% नलगाउनुहोला ।
 - यो औषधि कोठीमा, जन्मदेखिको निसानामा (Birthmark) कपाल उम्रेको मुसामा, गुप्ताङ्गमा (Genital warts), अनुहारको मुसामा (Warts on face or mucous membrane) प्रयोग नगर्नुहोला ।
 - केलाइटिक् ४०% सँगै अरु औषधि एकै ठाँउमा प्रयोग नगर्नुहोला ।

- २ वर्ष भन्दा मुनिको बच्चामा प्रयोग नगर्नुहोला ।
- केलाइटिक् ४०% गर्भवति (Pregnant) र स्तनपान (Breast Feeding) गराउने महिलाले प्रयोग नगर्नुहोला वा चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम मात्र प्रयोग गर्नुहोला ।
- केलाइटिक् ४०% मधुमेहको रोगीले प्रयोग नगर्नुहोला वा चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम मात्र प्रयोग गर्नुहोला ।
- यदि तपाईं यो औषधि (Salicylic Acid) प्रति संवेदनशिल हुनुहुन्छ भने केलाइटिक् ४०% प्रयोग नगर्नुहोला ।

८. प्रतिअसर (Side effect)

प्रतिअसर सबैलाई नदेखिन सक्छ । कसैलाई छालामा निम्न अनुसारको प्रतिअसर हुन सक्छ ।

- पोल्ने
- छाला रातो हुने
- सुख्खा हुने
- फनफनाउने
- छाला उर्ककने (Peeling of skin)

तर यो प्रतिअसर हल्का वा मन्द रूपमा मात्र देखिन सक्छ ।

९. अतिमात्रा (Overdose) को प्रतिअसर

यदि तपाईंले केलाइटिक् ४०% मलम लगाउदा

- कान बज्ने (Ringing sound in ear),
- बाक बाक लाग्ने (Vomiting),
- पखला लाग्ने (Diarrhoea),

जस्ता असर देख्नु भयो भने प्रयोग तत्काल रोक्नुहोला र चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोला ।

१०. केलाइटिक् ८०% लगाउन छुटेमा

औषधि लगाउन सम्भने बित्तिकै लगाउनु होला तर दोब्बर मात्रामा नलगाउनुहोला ।

११. केलाइटिक् ८०% संचय (Storage) गर्ने तरिका

- केलाइटिक् ४०% मलम बच्चाहरुले नभेट्ने र ओभानो ठाँउमा सुरक्षित राख्नुहोला ।
- घाम पर्ने ठाँउमा नराख्नुहोला ।
- म्याद समाप्त भएको औषधि प्रयोग नगर्नुहोला ।

१२. प्रस्तुती (Presentation)

केलाइटिक् ४०% मलम १५ ग्राम को ट्युबमा उपलब्ध छ ।



Deurali-Janta Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

GPO Box 4239, 355 Hattisar Road, Kamalpokhari, Kathmandu, Nepal.

Tel: 4435167/68/69 E-mail: mplanning@deuralijanta.com

Website: www.deuralijanta.com